

日本薬局方 薬価基準収載
(61AM) 2798

サンシシ
(花扇サンシシK)

(用法・用量) 漢方処方調剤に用いる

(効能・効果) 漢方処方調剤に用いる

(保管上の注意) 本品は直射日光をさけ、
なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

内容量 500g

Lot No.



(01)14987527063202

製造発売元 小西製薬株式会社
大阪府東大阪市上石切町2-33-11

〈使用上の注意〉

1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2) サンシシ含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合にあつては、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。
- (3) 漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

2. 副作用

重大な副作用

腸間膜静脈硬化症：長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。