

医療用

薬価基準収載品
15700AMZ00887000

日本薬局方 サンシシ 山梔子

<販売包装単位> 500g

製造番号

用法・用量：漢方処方での調剤に用いる

効能・効果：漢方処方での調剤に用いる

◎クチナシ *Gardenia jasminoides* Ellis (*Rubiaceae*) の果実

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- サンシシ含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合にあつては、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。
- 漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

2. 副作用

(1) 重大な副作用

腸間膜静脈硬化症：長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。

株式会社 栢本天蔭堂

大阪市北区末広町3番21号

TEL 06(7711)0730

<調剤包装単位>

[脱酸素剤入]

トチモのサンシシ

【取り扱い上の注意】

- 本品は、性質上吸湿しやすいものがありますので、湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
- 品質には細心の注意をはらっておりますが、お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。