

**2011年6月改訂(第5版)
*2005年4月改訂

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	61AM-4130
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年11月

貯法：室温保存 注意：「取扱い上の注意」 の項参照 使用期限：容器又は外箱に表示

商品番号
J-10

漢方製剤
JPS 柴胡桂枝湯 エキス顆粒〔調剤用〕

【組成・性状】

販売名	JPS 柴胡桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕	
剤形・色調	顆粒・淡かっ色	
におい・味	特異の芳香があり、わずかに甘味と苦味がある	
含量：本剤 7.5g中	日局サイコ……5.0g 日局ケイヒ……2.5g 日局オウゴン……2.0g 日局タイソウ……2.0g 日局ショウキョウ……1.0g	日局ハンゲ……4.0g 日局シャクヤク……2.0g 日局ニンジン……2.0g 日局カンゾウ……1.5g
	**上記の混合生薬より抽出した日局柴胡桂枝湯エキス3.8gを含有する。 添加物…ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物	

【効能・効果】

多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒け・頭痛・はき気などのある感冒、風邪の後期の症状

【用法・用量】

通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1)本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2)本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止すること。
- (3)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

2. 相互作用

【併用注意】(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(1)カンゾウ含有製剤	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、	グリチルリチン酸は尿管でのカリウム排泄
(2)グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤	低カリウム血症の結果として、ミオパシーがあらわれやすくなる。(「重大な副作用」の項参照)	促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

(1)重大な副作用

- 1)間質性肺炎：発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、直ちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。

- 2)偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 3)ミオパシー：低カリウム血症の結果としてミオパシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 4)肝機能障害、黄疸：AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^(注1)	発疹、発赤、瘙痒、蕁麻疹等
消化器	下痢、便秘、消化不良等
泌尿器 ^(注2)	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感、膀胱炎等

注1)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。
注2)このような症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない。〕

7. その他の注意

類似処方の小柴胡湯では、インターフェロン-αとの併用例で間質性肺炎の副作用が多く報告されている。

【取扱い上の注意】

直射日光をさけ、防湿に注意すること。開封後は湿気をさけ、フタをよく閉めて保存すること。

【包装】

500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)

【文献請求先】

ジェーピーエス製薬株式会社 医薬部
〒224-0023 横浜市都筑区東山田4-42-22
TEL (045) 593-2060



***ジェーピーエス製薬株式会社**
製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1
本社 横浜市都筑区東山田4-42-22