

※※2017年8月改訂(第8版)

※2008年7月改訂

貯 法：気密容器、室温保存 （「取扱い上の注意」の項参照）
使用期限：容器、外箱に表示

商品番号	11
------	----

## 漢方製剤 サイコケイシカンキョウトウ ティイコク柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	(61AM)3691
薬価収載	1988年7月
販売開始	1988年7月

### ※[組成・性状]

組成	本品 7.5 g 中	
	日局 サイコ	6.0 g
	日局 ケイヒ	3.0 g
	日局 カロコン	4.0 g
	日局 オウゴン	3.0 g
	日局 ボレイ	3.0 g
	日局 カンキョウ	3.0 g
	日局 カンゾウ	2.0 g
上記の混合生薬より製した水製乾燥エキス 2.96 g を含有する。		
性状	添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム
	剤形	顆粒剤
	色	淡褐色
	におい	特異なにおい
	味	やや甘苦い
識別コード TEIKOKU 11 (分包品に表示)		

### [効能・効果]

体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏のものの次の諸症：更年期障害、血の道症、不眠症、神経症

### [用法・用量]

通常成人1日3回、1回2.5 gを食前に経口投与する。  
なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

### [使用上の注意]

#### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2) 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止すること。
- (3) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

#### 2. 相互作用

##### 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤 グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。 また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。 (「重大な副作用」の項参照)	グリチルリチン酸は、尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。

### 3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

#### (1) 重大な副作用

- 1) 間質性肺炎：発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。
- 2) 偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 3) ミオパチー：低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 4) 肝機能障害、黄疸：AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、γ-GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

#### (2) その他の副作用

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹、発赤、瘙痒等

注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

#### 4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

#### 5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

#### 6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない。]

[取扱い上の注意]

- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保存すること。
- 吸湿性があるので、開封後は湿気に注意して保存すること。

[包 裝]

500 g 2.5 g × 42 包 2.5 g × 252 包

※※[文献請求先]

帝國製薬株式会社 医薬営業部 製品情報室  
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 6 番 6 号  
TEL : 0120-189-567

※※販 売 元  帝國製藥株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元  帝國漢方製藥株式会社  
徳島県阿波市土成町土成字北原80番11