

貯法：室温保存
使用期限：容器・外箱に記載の使用期限内に使用してください。
注意：取扱い上の注意の項参照

承認番号	(61AM)4033
葉価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

商品番号 N122

漢方製剤
コタロー
排膿散及湯エキス細粒

〔禁 忌（次の患者には投与しないこと）〕

- 1) アルドステロン症の患者
 - 2) ミオパチーのある患者
 - 3) 低カリウム血症のある患者
- [1]～[3]：これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。]

〔組成・性状〕

***〔1〕組成**

本剤7.5g中
日局 キキョウ…………4.0g
日局 カンゾウ…………3.0g
日局 タイソウ…………3.0g

日局 シャクヤク…………3.0g
日局 ショウキョウ…………0.5g
日局 キジツ……………2.0g

上記の混合生薬より抽出した排膿散及湯の水製乾燥エキス4.7gを含有する。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ブルラン、メタケイ酸アルミニウムマグネシウムを含有する。

〔2〕製剤の性状

本剤は茶褐色～黄褐色の細粒で、特異なにおいがあり、味は甘苦い。

識別コード：N122

〔効能・効果〕

患部が発赤、腫脹して疼痛をともなった化膿症、瘍、癰、面疔、その他癌腫症。

〔用法・用量〕

通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

〔1〕重要な基本的注意

- 1) 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2) 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止すること。
- 3) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

〔2〕相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
①カンゾウ含有製剤	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。	偽アルドステロン症が出現する際には、利尿剤は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
②グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤	偽アルドステロン症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。（「重大な副作用」の項参照）	
③ループ系利尿剤 フロセミド エタクリン酸		
④チアジド系利尿剤 トリクロルメチアジド		

〔3〕副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

重大な副作用

- ①**偽アルドステロン症**：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- ②**ミオパチー**：低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

〔4〕高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

〔5〕妊娠・産婦・授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。

〔6〕小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。 [使用経験が少ない。]

〔取扱い上の注意〕

- (1) 漢方製剤は吸湿しやすいので、湿気を避け、直射日光の当らない涼しい場所に保管してください。

特に、ポリ瓶の場合はキャップを堅く締めて保管してください。

- (2) 本剤は天然の生薬を原料としていますので、ロットにより色調等に異同がありますが、効能その他に変わりはありません。

〔包 装〕

コタロー排膿散及湯エキス細粒

ポリ瓶	500g
分包	2.5g×189包 (472.5g) 2.5g×42包 (105g)

****〔資料請求先〕**

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部

〒531-0071

大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06-6371-9106 FAX 06-6377-4140

(9:00～17:30／土、日、祝日、弊社休日を除く)

製造販売元



小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号