

注射用蒸留水「CMX」

規制区分：処方せん医薬品^(注)
貯 法：室温保存
使用期限：容器に表示の使用期限内
に使用すること

日本標準商品分類番号	877131		
※ 許可番号	14A1X00001		
注射用蒸留水	500mL	1000mL	
薬 値 収 載	薬 値 基 準 収 載	薬 値 基 準 収 載	
※※ 販 売 開 始	2012年4月	2012年4月	

【組成・性状】

本剤は、プラスチックボトル1本中に注射用水（注射用蒸留水）を500mLまたは1000mL含有する。

【効能・効果】

注射剤の溶解希釈剤、注射剤の製剤

【用法・用量】

本品の適量をとり、注射剤の溶解、希釈に用いる。
また、注射剤の製剤に用いる。

【使用上の注意】

適用上の注意

- (1) 調製時：注射剤の溶解・希釈液として使用する場合は、注射用水が適切であることを確認すること。
- (2) 投与前：
 - ①投与に際しては、感染に対する配慮をすること（患者の皮膚や器具消毒）。
 - ②開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。
- (3) 投与時：溶解・希釈した注射剤の用法・用量及び使用上の注意に留意して投与すること。

【取扱上の注意】

容器の液目盛りはおよその目安として使用すること。

「安定性試験」¹⁾

最終包装製品を用いた長期保存試験(25±2°C、3年間)の結果、注射用蒸留水「CMX」は、通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

【包 装】

注射用蒸留水「CMX」

500mL 20本入り（広口開栓）
1000mL 10本入り（広口開栓）

【主要文献】


1) (株)ケミックス 社内資料：安定性試験

※※【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
☎ (0120) 517-215 Fax (076) 442-8948

容器の開栓方法



- ①ボトルの首又は底の部分を持ちボトルを回転させて下さい。
 - ②パチッという音を確認後、キャップをまっすぐ引き上げて下さい。
- *キャップは回転させないで下さい。

※※販売元
日医工株式会社
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売(輸入)元
株式会社 ケミックス
※横浜市港北区新横浜2-15-10