



日本標準商品分類番号
877131

2014年6月作成（第1版）

貯法：室温保存
使用期限：容器、外箱に表示の使用
期限内に使用すること

注意：「取扱い上の注意」の項参照

処方箋医薬品
（注意－医師等の処方箋
により使用すること）

日本薬局方

許可番号	27A1X00039
薬価収載	2014年6月
販売開始	2014年6月

注射用水（注射用蒸留水）

Water for Injection

注射用水バッグ「フソー」

【組成・性状】

1. 組成

注射用水バッグ「フソー」は1バッグ（袋）中注射用水（注射用蒸留水）1000mLを含む無色澄明の注射液である。

2. 製剤の性状

注射用水バッグ「フソー」はポリエチレン製バッグ（FC：フレキシブルコンテナ）入りの無色澄明、無味無臭の注射液である。

【効能・効果】

注射用医薬品の溶解・希釈剤

【用法・用量】

注射用医薬品の溶解・希釈に適量を用いる。

【使用上の注意】

適用上の注意

- 調製時：注射剤の溶解希釈剤として使用する場合は、注射用水が適切であることを確認すること。
- 投与前：
 - 投与に際しては、感染に対する配慮をすること（患者の皮膚や器具消毒）。
 - 開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。
- 投与时：溶解希釈した注射剤の用法・用量及び使用上の注意に留意して投与すること。

【取扱い上の注意】

- 通気針は不要
- 連結管による連続投与は行わないこと。連続投与を行う場合には、Y型タイプのセットを使用すること
- 内容液の漏出又は混濁などが認められた場合は使用しないこと
- オーバースील（ゴム栓部の汚染防止のためのシール）が万一はがれているときは使用しないこと
- ゴム栓への針刺は、ゴム栓面に垂直に、ゆっくりと行うこと。斜めに刺すと、ゴム片（コア）が薬液中に混入したり、ポート部を傷つけて液漏れを起こすおそれがある
- 容器の目盛はおよその目安として使用すること

【包装】

1000mL 10袋（FC）

FC（フレキシブルコンテナ）は、弊社が開発したポリエチレン製の輸液用バッグである。

【主要文献及び文献請求先】

【文献請求先】 扶桑薬品工業株式会社 研究開発センター 学術部門
〒536-8523 大阪市城東区森之宮二丁目3番30号
TEL 06-6964-2763 FAX 06-6964-2706
(9:00～17:30/土日祝日を除く)

製造販売元



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

DK-908-908B