

貯 法：室温保存  
有効期間：3年

処方箋医薬品<sup>(注)</sup>  
ブドウ糖-電解質液（脱水補給液）

日本標準商品分類番号	873319
承認番号	22000AMX00749

# ソルデム2 輸液 SOLDEM 2 Infusion

注）注意—医師等の処方箋により使用すること

## 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 高乳酸血症の患者 [高乳酸血症が悪化するおそれがある。]  
2.2 高カリウム血症、乏尿、アジソン病、重症熱傷、高窒素血症の患者 [高カリウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]

## 3. 組成・性状

### 3.1 組成

		1袋200mL中	1袋500mL中
有効成分	ブドウ糖	2.90g	7.25g
	塩化ナトリウム	0.34g	0.85g
	塩化カリウム	0.448g	1.120g
	L-乳酸ナトリウム液 (L-乳酸ナトリウムとして)	2.176g (1.088g)	5.440g (2.720g)
電解質	Na <sup>+</sup>	15.5mEq	38.75mEq
	K <sup>+</sup>	6mEq	15mEq
	Cl <sup>-</sup>	11.8mEq	29.5mEq
	L-Lactate <sup>-</sup>	9.7mEq	24.25mEq
熱量		11.6kcal	29kcal

### 3.2 製剤の性状

性状	無色透明の液
pH	4.5~7.0
浸透圧比	約1 (生理食塩液に対する比)

## 4. 効能又は効果

### 脱水症及び手術前後の水分・電解質の補給・補正

## 5. 効能又は効果に関する注意

本剤を投与する場合には、患者の尿量が1日500mL又は1時間当たり20mL以上あることが望ましい。

## 6. 用法及び用量

通常成人、1回500~1000mLを点滴静注する。投与速度は通常成人1時間当たり300~500mL、小児の場合、1時間当たり50~100mLとする。

なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

#### 9.1.1 糖尿病の患者

血糖値が上昇することにより、症状が悪化するおそれがある。

#### 9.1.2 心不全の患者

循環血液量の増加により、症状が悪化するおそれがある。

#### 9.1.3 導管性尿路疾患により尿量が減少している患者

水分、電解質等の排泄が障害されているため、症状が悪化するおそれがある。

#### 9.2 腎機能障害患者

水分、電解質の過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。

#### 9.3 肝機能障害患者

##### 9.3.1 重篤な肝障害のある患者

水分、電解質代謝異常、高乳酸血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。

#### 9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

## 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

## 9.7 小児等

1歳未満の乳児に急速投与（100mL/時間以上）した場合に高カリウム血症があらわれることがある。

## 9.8 高齢者

投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.2 その他の副作用

	頻度不明
大量・急速投与	脳浮腫、肺水腫、末梢の浮腫、アルカローシス、高カリウム血症

## 14. 適用上の注意

### 14.1 全般的な注意

14.1.1 使用時には、感染に対する配慮をすること。

14.1.2 注射針や輸液セットのびん針は、ゴム栓の刻印部（○印）に垂直にゆっくりと刺すこと。斜めに刺した場合、削り片の混入及び液漏れの原因となるおそれがある。また、針は同一箇所に繰り返し刺さないこと。

### 14.2 薬剤調製時の注意

薬剤を配合する場合には、配合変化に注意すること。

### 14.3 薬剤投与時の注意

14.3.1 原則として、連結管を用いたタンデム方式による投与は行わないこと。輸液セット内に空気が流入するおそれがある。

14.3.2 容器の目盛りは目安として使用すること。

14.3.3 残液は使用しないこと。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

本剤は水分・電解質の補給・補正効果を示す。

## 20. 取扱い上の注意

20.1 液漏れの原因となるので、強い衝撃や鋭利なものとの接触等を避けること。

20.2 包装袋より取り出したまま保管すると、薬液が蒸散する可能性があるので、速やかに使用するか包装袋に戻し封をすること。

20.3 以下の場合には使用しないこと。

- ・包装袋内や容器表面に水滴や結晶が認められる場合

- ・容器から薬液が漏れている場合

- ・性状その他薬液に異状が認められる場合

- ・ゴム栓部のシールがはがれている場合

## 22. 包装

200mL×30袋

500mL×20袋

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

テルモ・コールセンター

〒259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1500

TEL 0120-12-8195

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



テルモ株式会社  
東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 44 番 1 号