

抗悪性腫瘍剤  
シスプラチン製剤日本標準商品分類番号  
874291貯法：室温保存  
有効期間：3年ランダ®  
ランダ®  
ランダ®

10mg/20mL

25mg/50mL

50mg/100mL

Randa® Injection

10mg/20mL・25mg/50mL・50mg/100mL

毒薬、処方箋医薬品<sup>注</sup>

注）注意—医師等の処方箋により使用すること

	10mg/20mL	25mg/50mL	50mg/100mL
承認番号	22000AMX01851	22000AMX01852	22000AMX01853
販売開始	1984年3月		

## 1. 警告

- 1.1 本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例についてのみ実施すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
- 1.2 本剤を含む小児悪性固形腫瘍に対するがん化学療法は、小児のがん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで実施すること。

## 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 重篤な腎障害のある患者〔腎障害を増悪させることがある。また、腎からの排泄が遅れ、重篤な副作用が発現することがある。〕[9.2.1 参照]
- 2.2 本剤又は他の白金を含む薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 [9.5 参照]

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	ランダ注 10mg/20mL	ランダ注 25mg/50mL	ランダ注 50mg/100mL
有効成分 (1バイアル中)	シスプラチン 10mg	シスプラチン 25mg	シスプラチン 50mg
添加剤	塩化ナトリウム、pH調節剤		

## 3.2 製剤の性状

販売名	ランダ注 10mg/20mL	ランダ注 25mg/50mL	ランダ注 50mg/100mL
性状	無色～微黄色澄明の注射剤		
pH	2.0～5.5		
浸透圧比	約1（生理食塩液に対する比）		

## 4. 効能・効果

## ○シスプラチン通常療法

睾丸腫瘍、膀胱癌、腎盂・尿管腫瘍、前立腺癌、卵巣癌、頭頸部癌、非小細胞肺癌、食道癌、子宮頸癌、神経芽細胞腫、胃癌、小細胞肺癌、骨肉腫、胚細胞腫瘍（精巣腫瘍、卵巣腫瘍、性腺外腫瘍）、悪性胸膜中皮腫、胆道癌

以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法

悪性骨腫瘍、子宮体癌（術後化学療法、転移・再発時化学療法）、再発・難治性悪性リンパ腫、小児悪性固形腫瘍（横紋筋肉腫、神経芽腫、肝芽腫その他肝原発悪性腫瘍、髄芽腫等）

## ○M-VAC療法

尿路上皮癌

## 5. 効能・効果に関連する注意

## 〈シスプラチン通常療法〉

胆道癌での本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。

## \*\*6. 用法・用量

## 〈シスプラチン通常療法〉

(1) 睾丸腫瘍、膀胱癌、腎盂・尿管腫瘍、前立腺癌には、A法を標準的用法・用量とし、患者の状態によりC法を選択する。卵巣癌には、B法を標準的用法・用量とし、患者の状態によりA法、C法を選択する。

頭頸部癌には、D法を標準的用法・用量とし、患者の状態によりB法を選択する。

非小細胞肺癌には、E法を標準的用法・用量とし、患者の状態によりF法を選択する。

食道癌には、B法を標準的用法・用量とし、患者の状態によりA法を選択する。

子宮頸癌には、A法を標準的用法・用量とし、患者の状態によりE法を選択する。子宮頸癌における同時化学放射線療法の場合にはJ法を選択する。

神経芽細胞腫、胃癌、小細胞肺癌には、E法を選択する。

骨肉腫には、G法を選択する。

胚細胞腫瘍には、確立された標準的な他の抗悪性腫瘍剤との併用療法として、F法を選択する。

悪性胸膜中皮腫には、ペメトレキセドとの併用療法として、H法を選択する。

胆道癌には、ゲムシタピン塩酸塩との併用療法として、I法を選択する。

A法：シスプラチンとして15～20mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1日1回、5日間連続投与し、少なくとも2週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

B法：シスプラチンとして50～70mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1日1回投与し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

C法：シスプラチンとして25～35mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1日1回投与し、少なくとも1週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

D法：シスプラチンとして10～20mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1日1回、5日間連続投与し、少なくとも2週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

E法：シスプラチンとして70～90mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1日1回投与し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

F法：シスプラチンとして20mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1日1回、5日間連続投与し、少なくとも2週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

G法：シスプラチンとして100mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1日1回投与し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

なお、A～G法の投与量は疾患、症状により適宜増減する。

H法：シスプラチンとして75mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1日1回投与し、少なくとも20日間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

I法：シスプラチンとして25mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を60分かけて点滴静注し、週1回投与を2週連続し、3週目は休薬する。これを1クールとして投与を繰り返す。

J法：シスプラチンとして40mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1日1回投与し、6日間休薬する。これを1クールとして投与を繰り返す。

なお、H～J法の投与量は患者の状態により適宜減量する。  
(2) 以下の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法の  
場合

#### 悪性骨腫瘍の場合

ドキシソルビシン塩酸塩との併用において、シスプラチンの  
投与量及び投与方法は、シスプラチンとして100mg/m<sup>2</sup>（体  
表面積）を1日1回投与し、少なくとも3週間休薬する。これ  
を1クールとし、投与を繰り返す。本剤単剤では、G法を選  
択する。

なお、投与量は症状により適宜減量する。

#### 子宮体癌の場合

ドキシソルビシン塩酸塩との併用において、シスプラチンの  
投与量及び投与方法は、シスプラチンとして50mg/m<sup>2</sup>（体  
表面積）を1日1回投与し、少なくとも3週間休薬する。これ  
を1クールとし、投与を繰り返す。

なお、投与量は症状により適宜減量する。

#### 再発・難治性悪性リンパ腫の場合

他の抗悪性腫瘍剤との併用において、シスプラチンの投与  
量及び投与方法は、1日量100mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を1日間持  
続静注し、少なくとも20日間休薬し、これを1クールとして  
投与を繰り返す。または1日量25mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を4日  
間連続持続静注し、少なくとも17日間休薬し、これを1ク  
ールとして投与を繰り返す。

なお、投与量及び投与日数は症状、併用する他の抗悪性腫  
瘍剤により適宜減する。

#### 小児悪性固形腫瘍（横紋筋肉腫、神経芽腫、肝芽腫その他肝 原発悪性腫瘍、髄芽腫等）に対する他の抗悪性腫瘍剤との併 用療法の場合

他の抗悪性腫瘍剤との併用において、シスプラチンの投与  
量及び投与方法は、シスプラチンとして60～100mg/m<sup>2</sup>（体  
表面積）を1日1回投与し、少なくとも3週間休薬する。これ  
を1クールとし、投与を繰り返す。

もしくは、他の抗悪性腫瘍剤との併用において、シスプラ  
チンの投与量及び投与方法は、シスプラチンとして20mg/m<sup>2</sup>  
（体表面積）を1日1回、5日間連続投与し、少なくとも2週間  
休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

なお、投与量及び投与日数は疾患、症状、併用する他の抗  
悪性腫瘍剤により適宜減する。

#### 〈M-VAC療法〉

(3) メトトレキサート、ビンブラスチン硫酸塩及びドキシソ  
ルビシン塩酸塩との併用において、通常、シスプラチンとし  
て成人1回70mg/m<sup>2</sup>（体表面積）を静注する。標準的な投与  
量及び投与方法は、メトトレキサート30mg/m<sup>2</sup>を1日目に投  
与した後に、2日目にビンブラスチン硫酸塩3mg/m<sup>2</sup>、ドキ  
ソルビシン塩酸塩30mg（力価）/m<sup>2</sup>及びシスプラチン  
70mg/m<sup>2</sup>を静注する。15日目及び22日目にメトトレキサ  
ート30mg/m<sup>2</sup>及びビンブラスチン硫酸塩3mg/m<sup>2</sup>を静注する。  
これを1コースとし、4週毎に繰り返す。

#### 7. 用法・用量に関連する注意

##### 〈シスプラチン通常療法〉

7.1 本剤の投与時には腎毒性を軽減するために下記の処置を  
行うこと。

##### 成人の場合

- ・本剤投与前、1,000～2,000mLの適当な輸液を4時間以上か  
けて投与する。
- ・本剤投与時、投与量に応じて500～1,000mLの生理食塩液又  
はブドウ糖-食塩液に混和し、2時間以上かけて点滴静注す  
る。なお、点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与  
すること。
- ・本剤投与終了後、1,000～2,000mLの適当な輸液を4時間以  
上かけて投与する。
- ・本剤投与中は、尿量確保に注意し、必要に応じてマンニ  
トール及びフロセミド等の利尿剤を投与すること。

なお、上記の処置よりも少量かつ短時間の補液法（ショート  
ハイドレーション法）については、最新の「がん薬物療法時  
の腎障害診療ガイドライン」等<sup>1,2)</sup>を参考にし、ショートハイ  
ドレーション法が適用可能と考えられる患者にのみ実施する  
こと。

##### 小児の場合

- ・本剤投与前、300～900mL/m<sup>2</sup>（体表面積）の適当な輸液を2  
時間以上かけて投与する。
- ・本剤投与時、投与量に応じて300～900mL/m<sup>2</sup>（体表面積）  
の生理食塩液又はブドウ糖-食塩液に混和し、2時間以上か  
けて点滴静注する。なお、点滴時間が長時間に及ぶ場合に  
は遮光して投与すること。
- ・本剤投与終了後、600mL/m<sup>2</sup>（体表面積）以上の適当な輸液  
を3時間以上かけて投与する。
- ・本剤投与中は、尿量確保に注意し、必要に応じてマンニ  
トール及びフロセミド等の利尿剤を投与すること。

#### 〈M-VAC療法〉

7.2 本剤の投与時には腎毒性を軽減するために、7.1項に準じ  
た処置を行うこと。

#### 8. 重要な基本的注意

##### 〈効能共通〉

- 8.1 悪心・嘔吐、食欲不振等の消化器症状がほとんど全例に  
起こるので、患者の状態を十分に観察し、適切な処置を行  
うこと。
- 8.2 腎障害、骨髄抑制等の重篤な副作用が起こることがある  
ので、頻回に臨床検査（腎機能検査、血液検査、肝機能検  
査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。ま  
た、使用が長期間にわたると副作用が強くなり、遷延性  
に推移することがあるので、投与は慎重に行うこと。な  
お、フロセミドによる強制利尿を行う場合は腎障害、聴器  
障害が増強されることがあるので、輸液等による水分補給  
を十分行うこと。[11.1.1、11.1.2、11.1.7、11.1.12 参照]
- 8.3 感染症、出血傾向の発現又は増悪に十分注意すること。
- 8.4 本剤の投与にあたってはG-CSF製剤等の適切な使用に関  
しても考慮すること。
- 8.5 投与量の増加に伴い聴器障害の発現頻度が高くなり、特  
に1日投与量では80mg/m<sup>2</sup>以上で、総投与量では300mg/m<sup>2</sup>  
を超えるとその傾向は顕著となるので十分な観察を行い  
投与すること。[11.1.4 参照]
- 8.6 高血糖、糖尿病の悪化があらわれることがあるので、血  
糖値や尿糖に注意するなど観察を十分に行うこと。  
[11.1.15 参照]

##### 〈シスプラチン通常療法〉

- 8.7 胆道癌に本剤を使用する際には、関連文献（「医療上の必  
要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該  
当性に係る報告書：シスプラチン（胆道癌）」等）を熟読す  
ること。
- 8.8 再発・難治性悪性リンパ腫に対する他の抗悪性腫瘍剤と  
の併用療法においては、関連文献（「抗がん剤報告書：シ  
スプラチン（悪性リンパ腫）」等）を熟読すること。
- 8.9 小児悪性固形腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療  
法においては、関連文献（「抗がん剤報告書：シスプラチ  
ン（小児悪性固形腫瘍）」等）を熟読すること。

#### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

##### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

###### 9.1.1 骨髄抑制のある患者

骨髄抑制を増悪させることがある。

###### 9.1.2 聴器障害のある患者

聴器障害を増悪させることがある。

###### 9.1.3 感染症を合併している患者

骨髄抑制により、感染症を増悪させることがある。

###### 9.1.4 水痘患者

致命的全身症状があらわれるおそれがある。

##### 9.2 腎機能障害患者

###### 9.2.1 重篤な腎障害のある患者

投与しないこと。[2.1 参照]

###### 9.2.2 腎障害のある患者（重篤な腎障害のある患者を除く）

副作用が強くなり、あらわれることがある。

##### 9.3 肝機能障害患者

代謝機能等が低下しているため、副作用が強くなり、あら  
われることがある。

#### 9.4 生殖能を有する者

- \*9.4.1 妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊をするよう指導すること。[9.5 参照]
- \*9.4.2 パートナーが妊娠する可能性のある男性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊をするよう指導すること。[15.2.1 参照]

9.4.3 小児及び生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には、性腺に対する影響を考慮すること。[15.1.3 参照]

#### \*9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。妊娠中に本剤と他の抗悪性腫瘍剤を併用された患者で、児の奇形及び胎児毒性<sup>3)</sup>が報告されている。また、動物実験で、ラットにおいて催奇形性、胎児致死率の増加、ウサギにおいて胎児致死率の増加が認められ、マウスにおいて催奇形性、胎児致死作用が報告されている。[2.3、9.4.1 参照]

#### 9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。ヒト母乳中に移行することが報告されている。

#### 9.7 小児等

- 9.7.1 副作用の発現に特に注意し、用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。外国で、聴器障害が高頻度に発現するとの報告がある。
- 9.7.2 小児の胚細胞腫瘍に対する確立された標準的な他の抗悪性腫瘍剤との併用療法においては、併用療法に付随する消化器障害、骨髄抑制、肺障害等の発現に十分注意し、慎重に投与すること。
- 9.7.3 小児悪性固形腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法においては、骨髄抑制、腎機能障害の発現に十分注意し、慎重に投与すること。また、血球貪食症候群、好酸球増多、心嚢液貯留、ファンコニー症候群、小脳出血、脳浮腫、てんかん、骨肉腫、非ホジキンリンパ腫、無月経、呼吸窮迫症候群等が発現したとの報告があるので、発現に十分注意し、慎重に投与すること。

#### 9.8 高齢者

用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能（骨髄機能、肝機能、腎機能等）が低下している。

#### 10. 相互作用

##### 10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗悪性腫瘍剤	骨髄抑制を増強することがある。患者の状態を観察しながら、減量するなど用量に注意すること。	骨髄抑制作用を有する。
放射線照射	骨髄抑制を増強することがある。患者の状態を観察しながら、減量するなど用量に注意すること。	骨髄抑制作用を有する。
	胸部への放射線照射の併用療法を行った場合に、重篤な皮膚炎、食道炎、嚥下障害又は肺臓炎が発現したとの報告がある。患者の状態を観察しながら、肺陰影等が出現した場合には、本剤の投与及び放射線照射を直ちに中止すること。	機序不明 動物試験（マウス）で本剤による放射線感受性増加が認められている。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
パクリタキセル	本剤をパクリタキセルの前に投与した場合、逆の順序で投与した場合より骨髄抑制が増強するおそれがある。本剤をパクリタキセルの後に投与すること。 末梢神経障害が増強するおそれがある。患者の状態を観察しながら、減量するか又は投与間隔を延長すること。	本剤をパクリタキセルの前に投与した場合、パクリタキセルのクリアランスが低下し、パクリタキセルの血中濃度が上昇する。 末梢神経障害を有する。
アミノグリコシド系抗生物質 ストレプトマイシン ゲンタマイシン アミカシン 等 バンコマイシン フロセミド	腎障害及び聴器障害が増強されることがある。	腎障害及び聴覚障害を有する。
アムホテリシンB（注射剤）	腎障害が増強されることがある。	腎障害を有する。
頭蓋内放射線照射	聴器障害が増強することがある。	機序不明 聴覚障害を有する。
ピレタニド		機序不明
フェニトイン	フェニトインの血漿中濃度が低下したとの報告がある。	機序不明

#### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

##### 11.1 重大な副作用

###### 11.1.1 急性腎障害（頻度不明）

急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがある。BUN、血清クレアチニン、クレアチニン・クリアランス値等に異常が認められた場合は投与を中止し、適切な処置を行うこと。その他、血尿、尿蛋白、乏尿、無尿があらわれることがある。[8.2 参照]

###### 11.1.2 骨髄抑制

汎血球減少（頻度不明）、貧血（30.8%）、白血球減少（40.0%）、好中球減少（頻度不明）、血小板減少（19.5%）等があらわれることがある。[8.2 参照]

###### 11.1.3 ショック（頻度不明）、アナフィラキシー（0.1%未満）

チアノーゼ、呼吸困難、胸内苦悶、血圧低下等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

###### 11.1.4 聴力低下・難聴（2.8%）、耳鳴（3.3%）

高音域の聴力低下、難聴、耳鳴等があらわれることがある。[8.5 参照]

###### 11.1.5 うっ血乳頭、球後視神経炎、皮質盲（すべて頻度不明）

うっ血乳頭、球後視神経炎、皮質盲等の視覚障害があらわれることがある。

###### 11.1.6 脳梗塞（頻度不明）、一過性脳虚血発作（頻度不明）

###### 11.1.7 溶血性尿毒症症候群（頻度不明）

血小板減少、溶血性貧血、腎不全を主徴とする溶血性尿毒症症候群があらわれることがある。[8.2 参照]

###### 11.1.8 心筋梗塞、狭心症、うっ血性心不全、不整脈（すべて頻度不明）

心筋梗塞、狭心症（異型狭心症を含む）、うっ血性心不全、不整脈（心室細動、心停止、心房細動、徐脈等）があらわれることがあるので、胸痛、失神、息切れ、動悸、心電図異常等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

###### 11.1.9 溶血性貧血（頻度不明）

クームス陽性の溶血性貧血があらわれることがある。

###### 11.1.10 間質性肺炎（頻度不明）

発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等を伴う間質性肺炎があらわれることがある。異常が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

### 11.1.11 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（頻度不明）

低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、水分摂取の制限等の適切な処置を行うこと。

### 11.1.12 劇性肝炎（頻度不明）、肝機能障害（頻度不明）、黄疸（0.1%未満）[8.2 参照]

### 11.1.13 消化管出血、消化性潰瘍、消化管穿孔（すべて頻度不明）

### 11.1.14 急性膵炎（頻度不明）

血清アミラーゼ値、血清リパーゼ値等に異常が認められた場合には投与を中止すること。

### 11.1.15 高血糖（頻度不明）、糖尿病の悪化（頻度不明）

昏睡、ケトアシドーシスを伴う重篤な症例も報告されている。[8.6 参照]

### 11.1.16 横紋筋融解症（頻度不明）

CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

### 11.1.17 白質脳症（可逆性後白質脳症候群を含む）（頻度不明）

歩行時のふらつき、舌のもつれ、痙攣、頭痛、錯乱、視覚障害等が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

### 11.1.18 静脈血栓塞栓症（頻度不明）

肺塞栓症、深部静脈血栓症等の静脈血栓塞栓症があらわれることがある。

## 11.2 その他の副作用

	10%以上	1～10%未満	1%未満	頻度不明
消化器	悪心・嘔吐 <sup>注)</sup> (85.3%)、食欲不振 (74.6%)	下痢、口内炎	イレウス、腹痛	便秘、腹部膨満感、口角炎
過敏症		発疹		ほてり
精神神経系		末梢神経障害（しびれ、麻痺等）、頭痛	痙攣	言語障害、味覚異常、意識障害、見当識障害、レールミツテ徴候
肝臓		AST上昇、ALT上昇、Al-P上昇、LDH上昇		ビリルビン上昇、 $\gamma$ -GTP上昇
循環器				動悸、頻脈、心電図異常、レイノー様症状
電解質		血清ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム、マグネシウム等の異常		テタニー様症状、血清リン異常
皮膚	脱毛 (24.4%)		そう痒、色素沈着	紅斑
その他	全身倦怠感 (42.0%)	発熱、吃逆	眩暈、疼痛、全身浮腫、血圧低下、胸痛	注射部位反応（発赤、腫脹、疼痛、壊死、硬結等）、血圧上昇、高尿酸血症、脱水

注) 処置として制吐剤等の投与を行う。

副作用の発現頻度は承認外の効能・効果及び用法・用量の症例を含む。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 本剤を点滴静注する際、クロールイオン濃度が低い輸液を用いる場合には、活性が低下するので必ず生理食塩液と混和すること。

14.1.2 本剤は、アルミニウムと反応して沈殿物を形成し、活性が低下するので、使用にあたってアルミニウムを含む医療器具を用いないこと。[14.2.3 参照]

14.1.3 本剤は、錯化合物であるので、他の抗悪性腫瘍剤とは混注しないこと。

14.1.4 本剤は、細胞毒性を有するため、調製時には手袋を着用することが望ましい。皮膚に薬液が付着した場合には、直ちに多量の流水でよく洗い流すこと。

14.1.5 本剤は、生理食塩液又はブドウ糖-食塩液に混和後、できるだけ速やかに投与すること。

### 14.2 薬剤投与時の注意

14.2.1 本剤は、光により分解するので直射日光を避けること。また、点滴時間が長時間に及ぶ場合には遮光して投与すること。[20.1 参照]

14.2.2 静脈内投与に際し、薬液が血管外に漏れると、注射部位に硬結・壊死等を起こすことがあるので、薬液が血管外に漏れないように慎重に投与すること。

14.2.3 使用にあたってアルミニウムを含む医療器具を用いないこと。[14.1.2 参照]

## 15. その他の注意

### 15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 小児悪性固形腫瘍において、肝芽腫に対し1歳未満又は体重10kg未満の小児等にはシスプラチンとして1日量を3mg/kgとした報告がある<sup>4-6)</sup>。

15.1.2 本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用により、急性白血病（前白血病相を伴う場合もある）、骨髄異形成症候群（MDS）が発生したとの報告がある。

15.1.3 進行精巣腫瘍患者に対して本剤を総量として400mg/m<sup>2</sup>以上で治療した場合には、精子濃度の回復は認められなかったとの報告がある。[9.4.3 参照]

### 15.2 非臨床試験に基づく情報

\* 15.2.1 本剤は、細菌を用いた復帰突然変異試験、ラットを用いた小核試験及びマウスを用いた染色体異常試験において、遺伝毒性が報告されている。[9.4.2 参照]

15.2.2 マウスに腹腔内投与した実験で、肺腺腫及び皮膚腫瘍が発生したとの報告がある。

## 16. 薬物動態

### 16.1 血中濃度

#### 16.1.1 反復投与

癌患者での点滴静注後の血中濃度の推移は、二相性の減衰曲線を示し、その $\beta$ 相の半減期は100時間前後と長く、投与後14日目の血中においても白金化合物が検出された<sup>7-9)</sup>。

### 16.5 排泄

主に腎から排泄される。癌患者における尿中排泄は、非常に緩慢であった。その排泄率は、投与後24時間では15.6～51.3%で、投与後5日目でも排泄率の高い例において45～75%であった<sup>7-9)</sup>。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈シスプラチン通常療法：辜丸腫瘍、膀胱癌、腎盂・尿管腫瘍、前立腺癌、卵巣癌、頭頸部癌、非小細胞肺癌、食道癌、子宮頸癌、神経芽細胞腫、胃癌〉

#### 17.1.1 国内第Ⅱ相試験

本剤単独投与による臨床試験において疾患別奏効率は次のとおりである。効果判定は厚生省班研究報告「固形がん化学療法直接効果判定基準」（小山、斎藤両班）に準じて行った<sup>10-19)</sup>。

腫瘍別	奏効率 <sup>注)</sup>
辜丸腫瘍	68.9% (31/45)
膀胱癌	52.9% (27/51)
腎盂・尿管腫瘍	36.4% (4/11)
前立腺癌	19.0% (11/58)
卵巣癌	57.6% (49/85)
頭頸部癌	25.8% (17/66)
非小細胞肺癌	19.4% (21/108)
食道癌	21.3% (10/47)
子宮頸癌	35.9% (14/39)
神経芽細胞腫	37.5% (3/8)

腫瘍別	奏効率 <sup>注)</sup>
胃癌	17.2% (16/93)

注) 承認外の用法・用量の症例も含む

主な副作用は、悪心・嘔吐80.7% (604/748例)、食欲不振71.1% (532/748例)、全身倦怠感39.6% (296/748例)で認められた。また主な臨床検査値異常は、クレアチニン・ケリアランス値低下39.5% (168/425例)、貧血(赤血球・ヘモグロビンの低下)32.7% (243/743例)、白血球減少30.2% (223/739例)であった。

### 〈シスプラチン通常療法：小細胞肺癌、骨肉腫〉

#### 17.1.2 海外臨床試験

本剤単独投与による臨床試験において疾患別奏効率は次のとおりである。

腫瘍別	奏効率 <sup>注)</sup>
小細胞肺癌	21.9% (14/64)
骨肉腫	20.4% (34/167)

注) 承認外の用法・用量の症例も含む

### 〈シスプラチン通常療法：子宮頸癌〉

#### \*\* 17.1.3 国際共同第Ⅲ相試験 (KEYNOTE-A18試験)

未治療<sup>注1)</sup>の国際産婦人科連合 (FIGO) 2014進行期分類のI B2~II B期 (リンパ節転移陽性) 又はIII~IV A期 (リンパ節転移陽性又は陰性) の局所進行子宮頸癌患者1,060例 (日本人90例を含む) を対象に、ペムプロリズマブ (遺伝子組換え) と同時化学放射線療法<sup>注2)</sup> (シスプラチン同時併用下での外部照射、及びその後の小線源治療 (CCRT) との併用の有効性及び安全性が、プラセボとCCRTとの併用<sup>注3)</sup> を対照とした二重盲検試験で検討された。主要評価項目は全生存期間 (OS) 及び無増悪生存期間 (PFS) とされ、ペムプロリズマブ (遺伝子組換え) とCCRTとの併用はプラセボとCCRTとの併用と比較してOS及びPFSを有意に延長した (表1、図1及び図2)。

安全性解析対象例528例中512例 (97.0%) (日本人41例中41例を含む) に副作用が認められた。主な副作用 (20%以上) は、貧血317例 (60.0%)、悪心304例 (57.6%)、下痢268例 (50.8%)、白血球数減少173例 (32.8%)、好中球数減少156例 (29.5%)、嘔吐135例 (25.6%)、白血球減少症125例 (23.7%)、血小板数減少116例 (22.0%)、好中球減少症114例 (21.6%) 及び甲状腺機能低下症112例 (21.2%) であった (2024年1月8日データカットオフ)。

表1 有効性成績 (KEYNOTE-A18試験)

		ペムプロリズマブ (遺伝子組換え) とCCRTとの併用 <sup>注2)</sup> (529例)	プラセボとCCRTとの併用 <sup>注3)</sup> (531例)
OS <sup>†</sup>	中央値 [月] (95%信頼区間)	NE (NE, NE)	NE (NE, NE)
	ハザード比 <sup>‡</sup> (95%信頼区間)	0.67 (0.50, 0.90)	-
	P値 <sup>§</sup>	0.0040	-
PFS <sup>¶</sup>	中央値 [月] (95%信頼区間)	NE (NE, NE)	NE (NE, NE)
	ハザード比 <sup>‡</sup> (95%信頼区間)	0.70 (0.55, 0.89)	-
	P値 <sup>§</sup>	0.0020	-

† : 中間解析時のデータ : 2024年1月8日カットオフ


‡ : 層別Cox比例ハザードモデルによるプラセボとCCRTとの併用との比較

§ : 層別ログランク検定

¶ : 中間解析時のデータ : 2023年1月9日カットオフ


NE : RECISTガイドライン1.1版に基づく治験担当医師判定

NE : Not Estimated



at risk  
 ペムプロリズマブ (遺伝子組換え) とCCRTとの併用 529 527 522 509 500 463 412 374 326 273 210 136 63 11 1  
 プラセボとCCRTとの併用 531 527 518 508 493 455 405 366 316 259 194 125 58 12 0

図1 OSのKaplan-Meier曲線 (KEYNOTE-A18試験)



at risk  
 ペムプロリズマブ (遺伝子組換え) とCCRTとの併用 529 462 400 331 282 222 171 100 26 3 0  
 プラセボとCCRTとの併用 531 463 379 306 263 208 149 88 20 0 0

図2 PFSのKaplan-Meier曲線 (KEYNOTE-A18試験)

- 注1) 子宮頸癌に対する根治的手術、放射線治療又は全身療法を受けておらず、かつ免疫療法による治療歴のない患者  
 注2) ペムプロリズマブ (遺伝子組換え) 200mgを3週間間隔投与 (Q3W) (各コースの1日目に投与) で5コース、シスプラチン40mg/m<sup>2</sup>を1週間間隔投与 (QW) で5回又は6回投与及び放射線治療 (外部照射とその後の小線源治療) 後、ペムプロリズマブ (遺伝子組換え) 400mgを6週間間隔投与 (Q6W) (各コースの1日目に投与) で15コース投与した。  
 注3) プラセボをQ3W (各コースの1日目に投与) で5コース及び注2) と同一のCCRT併用後、プラセボをQ6W (各コースの1日目に投与) で15コース投与した。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

癌細胞内のDNAと結合し、DNA合成及びそれに引き続く癌細胞の分裂を阻害するものと考えられている<sup>20)</sup>。

### 18.2 抗腫瘍効果

#### 18.2.1 *in vitro*

ヒト膀胱癌由来培養細胞株KK-47及びエールリッヒ腹水癌初代培養細胞に対し、抗腫瘍効果が認められ、その殺細胞作用様式は濃度依存性であった<sup>21)</sup>。

#### 18.2.2 *in vivo*

- (1) ノードマウス移植ヒト悪性腫瘍 (辜丸腫瘍、卵巣胎児性癌、前立腺癌、膀胱癌、胃癌) に対する抗腫瘍作用が認められた。マウスのエールリッヒ癌 (腹水・固型)、ザルコーマ180 (腹水・固型)、L1210又はP388白血病、B16メラノーマ、colon38大腸癌、WHT扁平上皮癌に対する抗腫瘍作用が認められた<sup>21-26)</sup>。  
 (2) ラット腹水肝癌、AH33、AH130、AH272、AH44、AH66及びウサギVX7癌に対する抗腫瘍作用が認められた<sup>26)</sup>。  
 (3) BBN誘発ラット膀胱癌に対し、マイトマイシンC、シクロホスファミド水和物より強い抗腫瘍作用が認められた<sup>27)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見


一般的名称 : シスプラチン (Cisplatin)

化学名 : (SP-4-2)-Diamminedichloroplatinum

分子式 : Cl<sub>2</sub>H<sub>6</sub>N<sub>2</sub>Pt

分子量 : 300.05

化学構造式 :



性状：シスプラチンは、黄色の結晶性の粉末である。  
N,N-ジメチルホルムアミドにやや溶けにくく、水に溶けにくく、エタノール（99.5）にほとんど溶けない。

## 20. 取扱い上の注意

20.1 包装開封後もバイアルを箱に入れて保存すること。

[14.2.1 参照]

20.2 冷蔵庫保存では結晶が析出することがある。

## 22. 包装

〈ランダ注10mg/20mL〉

20mL [1バイアル]

〈ランダ注25mg/50mL〉

50mL [1バイアル]

〈ランダ注50mg/100mL〉

100mL [1バイアル]

## \*23. 主要文献

- 1) 日本腎臓学会、日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、日本腎臓病薬物療法学会：がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン
- 2) 日本肺癌学会、日本臨床腫瘍学会：シスプラチン投与におけるショートハイドレーション法の手引き
- 3) 西村一記ほか：日本周産期・新生児医学会雑誌 2015；50：1322-1326
- 4) Ortega JA, et al. : J Clin Oncol. 2000；18：2665-2675
- 5) Douglass EC, et al. : J Clin Oncol. 1993；11：96-99
- 6) Katzenstein HM, et al. : J Clin Oncol. 2002；20：2789-2797
- 7) 岩崎武輝ほか：医学のあゆみ 1982；121：963-965
- 8) 澤田益臣ほか：癌と化学療法 1982；9：55-65
- 9) 堀内正敏ほか：癌と化学療法 1982；9：632-637
- 10) 新島端夫ほか：癌と化学療法 1982；9：46-54
- 11) 川井博ほか：癌と化学療法 1982；9：433-442
- 12) 加藤俊ほか：癌と化学療法 1982；9：694-701
- 13) 細川勉ほか：日本癌治療学会誌 1982；17：31-40
- 14) 犬山征夫ほか：癌と化学療法 1986；13：232-238
- 15) 福岡正博ほか：癌と化学療法 1985；12：471-478
- 16) 松岡緑郎ほか：癌と化学療法 1985；12：1407-1412
- 17) 石引久弥ほか：癌と化学療法 1989；16：3185-3193
- 18) 杉町圭蔵ほか：癌と化学療法 1989；16：341-347
- 19) 西平哲郎ほか：癌と化学療法 1986；13：2939-2946
- 20) Zwelling LA, et al. : Cancer Treat Rep. 1979；63：1439-1444
- 21) 高橋克俊ほか：癌と化学療法 1982；9：624-631
- 22) 澤田益臣ほか：日本産科婦人科学会雑誌 1981；33：519-524
- 23) 岡田謙一郎ほか：泌尿器科紀要 1979；25：993-1007
- 24) 由井康雄：日本泌尿器科学会雑誌 1979；70：28-45
- 25) 中島均：日本泌尿器科学会雑誌 1979；70：849-866
- 26) 長谷川嘉成ほか：癌と化学療法 1980；7：621-630
- 27) 宮川美栄子ほか：癌と化学療法 1982；9：258-262

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

日本化薬株式会社 医薬品情報センター  
〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号  
TEL.0120-505-282（フリーダイヤル）

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売元

 **日本化薬株式会社**  
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号