

貯法：室温保存  
使用期限：容器・外箱に記載の使用期限内に使用してください。  
注意：取扱い上の注意の項参照

承認番号	(61AM)3803
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

商品番号 | N25

漢方製剤

# コタロー 桂枝茯苓丸料エキス細粒

けい し ぶく りょう がん りょう

## 〔組成・性状〕

### \*\*〔1〕組成

本剤6.0g中  
日局 ケイヒ……………4.0g 日局 トウニン……………4.0g  
日局 ブクリョウ……………4.0g 日局 シャクヤク……………4.0g  
日局 ボタンピ……………4.0g

上記の混合生薬より抽出した桂枝茯苓丸料の水製乾燥エキス2.8gを含有する。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

### 〔2〕製剤の性状

本剤は茶褐色～黄褐色の細粒で、特異なおいがあり、味はやや辛く、やや苦い。

識別コード：N25

## 〔効能・効果〕

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ。

## 〔用法・用量〕

通常、成人1日6.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

## 〔使用上の注意〕

### 〔1〕慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

著しく体力の衰えている患者〔副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。〕

### 〔2〕重要な基本的注意

- 1)本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

### 〔3〕副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

#### 1)重大な副作用

肝機能障害、黄疸：AST(GOT)、ALT(GPT)、 $\text{AIP}$ 、 $\gamma\text{-GTP}$ の上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

#### 2)その他の副作用

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、発赤、痒痒等
消化器	食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢等

注1)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

### 〔4〕高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

### 〔5〕妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔本剤に含まれるトウニン、ボタンピにより流産の危険性がある。〕

### 〔6〕小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない。〕

## 〔取扱い上の注意〕

〔1〕漢方製剤は吸湿しやすいので、湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。

特に、ポリ瓶の場合はキャップを強く締めて保管してください。

〔2〕本剤は天然の生薬を原料としていますので、ロットにより色調等に異同がありますが、効能その他に変わりはありません。

## 〔包装〕

### コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒

ポリ瓶 500g  
分包 2.0g×231包(462g)  
2.0g×42包(84g)

## \*〔資料請求先〕

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部  
〒531-0071

大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06-6371-9106 FAX 06-6377-4140

(9:00～17:30/土、日、祝日、弊社休日を除く)

製造販売元



小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号