

\*\*2014年 2月改訂 第5版  
\*2005年 10月改訂  
薬効分類 漢方製剤

43

日本標準商品分類番号875200  
承認番号等  
(62AMY)0397 (薬価基準収載)  
薬価収載 1988.07 販売開始 1988.10

ゴ レイ サン リョウ  
〔東洋〕五苓散料エキス細粒

**\*\*【組成】**

本剤は、五苓散料の水製エキスに賦形剤(トウモロコシデンプン)を加えて製したものである。

本剤6.0g中

日局タクシヤ・・・5.0g 日局チョレイ・・・3.0g  
日局ビャクジュツ・・・3.0g 局外生規ケイシ・・・2.0g  
日局ブクリョウ・・・3.0g

上記の混合生薬より抽出した五苓散料の水製エキス3.0gを含有する。

**【性状】**

本品は、褐色の細粒で特異なおいと味を有する。(天然原料を使用するため、色調、味、においがロットにより若干異なることがあります。)

医薬品識別コード: TY-043

**【効能・効果】**

のどが渇いて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症:

水瀉性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ

**【用法・用量】**

通常 大人 1日 3回 1回 2.0g(1包)を空腹時経口投与  
年齢症状により適宜増減する。

**【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

2) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

**\*\*2. 副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

|         | 頻度不明   |
|---------|--|
| 過敏症 注1) | 発疹、発赤、そう痒等                                   |
| 肝臓      | 肝機能異常(AST(GOT)、ALT(GPT)、 $\gamma$ -GTP 等の上昇) |

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

5. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

**【取扱い上の注意】**

薬の品質を保つため、直射日光を避け、できるだけ湿気の少ない涼しいところに保管してください。

**【包装】**

500g, 2.0g×252包(分包品)

**【参考】**

原典: 傷寒論、金匱要略

参考文献: 「漢方処方応用の実際」山田光胤著

「改訂新版漢方処方集」龍野一雄編著

「漢方医学の基礎と診療」西山英雄著

「漢方薬入門」難波恒雄著

**\*\*【文献請求先】**

製造販売元 株式会社 東洋薬行

〒113-0033 東京都文京区本郷6-19-7

TEL 03-3813-2263 FAX 03-3813-0202

株式会社東洋薬行

東京都文京区本郷6-19-7