

* * 2015年2月改訂(第5版、自主改訂)
* 2006年3月改訂

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	61AM-4127
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年11月

貯法：室温保存 注意：「取扱い上の注意」 の項参照 使用期限：容器又は外箱に表示

商品番号
J-08

漢方製剤

JPS 大柴胡湯 エキス顆粒〔調剤用〕

【組成・性状】

販売名	J P S 大柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕
剤形・色調	顆粒・褐色
におい・味	特異な芳香があり、わずかに苦味がある
含量：本剤 7.5g中	日局 サ イ コ……………6g 日局 ハ ン ゲ……………4g 日局 ショウキョウ……………1g 日局 オウ ゴ ン……………3g 日局 シャクヤク……………3g 日局 タイ ソウ……………3g 日局 キ ジ ツ……………2g 日局 ダイ オウ……………1g * * 上記の混合生薬より抽出した日局大柴胡湯エキ ス4.5gを含有する。 添加物…ステアリン酸Mg、ショ糖脂肪酸エステル、 乳糖水和物

【効能・効果】

がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるも
のの次の諸症

胃炎、常習便秘、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、
肥満症

【用法・用量】

通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経
口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1)下痢、軟便のある患者〔これらの症状が悪化するおそれがある。〕
- (2)著しく胃腸の虚弱な患者〔食欲不振、腹痛、下痢等があらわれることがある。〕
- (3)著しく体力の衰えている患者〔副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。〕

2. 重要な基本的注意

- (1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ダイオウを含む製剤との併用には、特に注意すること。
- (3)ダイオウの瀉下作用には個人差が認められるので、用法・用量に注意すること。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

(1)重大な副作用

- 1)間質性肺炎：発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常（捻髪音）等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。

- 2)肝機能障害、黄疸：AST (GOT)、ALT (GPT)、Al-P、 γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	頻度不明
消化器	食欲不振、腹痛、下痢等

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔本剤に含まれるダイオウの子宮収縮作用及び骨盤内臓器の充血作用により流産の危険性がある。〕
- (2)授乳中の婦人には慎重に投与すること。〔本剤に含まれるダイオウ中のアントラキノン誘導体が母乳中に移行し、乳児の下痢を起こすことがある。〕

6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない。〕

【取扱い上の注意】

直射日光をさけ、防湿に注意すること。開封後は湿気をさけ、フタをよく閉めて保存すること。

【包装】

500g 750g(2.5g×300包) 105g(2.5g×42包)

【文献請求先】

ジェーピーエス製薬株式会社 営業部
〒224-0023 横浜市都筑区東山田4-42-22
TEL (045) 593-2060

*
ジェーピーエス製薬株式会社
製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1
発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22