

貯 法：気密容器、室温保存  
 (「取扱い上の注意」の項参照)  
 使用期限：容器、外箱に表示

日本標準商品分類番号  
 875200

商品番号 23

承認番号 (61AM)3704  
 薬価収載 1987年10月  
 販売開始 1987年10月

漢方製剤  
 トウ キ シャク ヤク サン  
 テイコク当帰芍薬散エキス顆粒

〔組成・性状〕

組成	本品 7.5 g 中	
	日局 ト ウ キ	3.0 g
	日局 センキュウ	3.0 g
	日局 シャクヤク	4.0 g
	日局 ブクリョウ	4.0 g
	日局 ビャクジュツ	4.0 g
	日局 タクシャ	4.0 g
	上記の混合生薬より製した水製乾燥エキス 3.20 g を含有する。	
	添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム
性状	剤形	顆粒剤
	色	淡褐色
	におい	特異なにおい
	味	わずかに甘く、後に苦味が残る
	識別コード	TEIKOKU 23 (分包品に表示)

〔効能・効果〕

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ

〔用法・用量〕

通常成人1日3回、1回2.5gを食前に経口投与する。  
 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

- 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
  - 著しく胃腸の虚弱な患者〔食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等があらわれることがある。〕
  - 食欲不振、悪心、嘔吐のある患者〔これらの症状が悪化するおそれがある。〕
- 重要な基本的注意
  - 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
  - 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

※3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過 敏 症 <sup>注)</sup>	発疹、痒痒等
肝 臓	肝機能異常 (AST(GOT)、ALT(GPT) 等の上昇)
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等

注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない。〕

〔取扱い上の注意〕



- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保存すること。
- 吸湿性であるので、開封後は湿気に注意して保存すること。

〔包 装〕

500 g          2.5 g × 42 包          2.5 g × 252 包

※※〔文献請求先〕

帝國製薬株式会社 医薬営業部 製品情報室  
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6番6号  
 TEL：0120-189-567

※※販 売 元  帝國製薬株式会社  
 香川県東かがわ市三本松567番地  
 製造販売元  帝國漢方製薬株式会社  
 徳島県阿波市土成町土成字北原80番11