

\*\*2020年9月改訂（第7版）  
\*2019年3月改訂

**貯法**：気密容器で室温保存  
**使用期限**：外箱等に表示の使用期限内に使用すること  
**規制区分**：処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

	錠75mg	錠100mg
承認番号	22100AMX02162000	22100AMX02185000
薬価収載	2009年11月	2009年11月
販売開始	2009年11月	2009年11月

経口用セフェム系抗生物質製剤

日本薬局方 セフカペン ピボキシル塩酸塩錠  
セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg 「日医工」  
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 「日医工」  
Cefcapene Pivoxil Hydrochloride

**【禁忌（次の患者には投与しないこと）】**

\* 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

**【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】**

\* セフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

**【効能・効果】**

<適応菌種>

セフカペンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンスシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・ビビアを除く）、アクネ菌

<適応症>

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎

<効能・効果に関連する使用上の注意>

\*\* 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、中耳炎、副鼻腔炎への使用にあたっては、「抗微生物薬適正使用の手引き」<sup>1)</sup>を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。

**【用法・用量】**

通常、成人にはセフカペン ピボキシル塩酸塩水和物として1回100mg（力価）を1日3回食後経口投与する。  
なお、年齢及び症状に応じて適宜増減するが、難治性又は効果不十分と思われる症例には1回150mg（力価）を1日3回食後経口投与する。

<用法・用量に関連する使用上の注意>

本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。

**【使用上の注意】**

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者
- 本人又は両親、兄弟に気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギー症状を起こしやすい体質を有する患者
- 高度の腎障害のある患者 [血中濃度が持続するので、投与量を減らすか、投与間隔をあけて使用すること。]
- 経口摂取の不良な患者又は非経口栄養の患者、全身状態の悪い患者 [ビタミンK欠乏症状があらわれることがあるので観察を十分に行うこと。]
- 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）

2. 重要な基本的注意

ショックがあらわれるおそれがあるので、十分な問診を行うこと。

**【組成・性状】**

1. 組成

販売名	セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg 「日医工」	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 「日医工」
有効成分	1錠中 セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 75mg（力価）	1錠中 セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 100mg（力価）
添加物	トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、白糖、マクロゴール、酸化チタン、タルク	トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、白糖、マクロゴール、酸化チタン、タルク、三二酸化鉄

2. 製剤の性状

販売名	セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg 「日医工」	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg 「日医工」	
剤形	円形のフィルムコーティング錠		
色調	白色	うすい赤色	
外形	表面		
	裏面		
	側面		
直径（mm）	7.7	8.7	
厚さ（mm）	3.6	3.9	
質量（mg）	165	220	
本体コード	n 377	n 378	
包装コード	㊟ 377	㊟ 378	

### 3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

#### (1) 重大な副作用（頻度不明）

##### 1) ショック、アナフィラキシー

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便秘、耳鳴、発汗、呼吸困難、血圧低下等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### 2) 急性腎障害

急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### 3) 無顆粒球症、血小板減少、溶血性貧血

無顆粒球症、血小板減少、溶血性貧血があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### 4) 偽膜性大腸炎、出血性大腸炎

偽膜性大腸炎、出血性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎があらわれることがあるので、腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には直ちに投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

##### 5) 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、紅皮症（剥脱性皮膚炎）

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、紅皮症（剥脱性皮膚炎）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### 6) 間質性肺炎、好酸球性肺炎

間質性肺炎、好酸球性肺炎があらわれることがあるので、発熱、咳嗽、呼吸困難等の症状があらわれた場合には投与を中止し、速やかに胸部X線検査、血液検査等を実施し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

##### 7) 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸

劇症肝炎等の重篤な肝炎、AST（GOT）、ALT（GPT）、Al-P等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### 8) 横紋筋融解症

筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、このような場合には、直ちに投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### (2) その他の副作用

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹、蕁麻疹、そう痒感、発赤、紅斑、腫脹、発熱、関節痛
血液	好酸球増多、顆粒球減少、貧血（赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少）、血小板減少
肝臓	ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、LDH上昇、Al-P上昇、 $\gamma$ -GTP上昇、黄疸
腎臓	BUN上昇、蛋白尿、血尿、クレアチニン上昇、浮腫
消化器	下痢、腹痛、胃不快感、胃痛、嘔気、嘔吐、食欲不振、便秘、口渇、口内しびれ感
菌交代症	口内炎、カンジダ症
ビタミン欠乏症	ビタミンK欠乏症状（低プロトロンビン血症、出血傾向等）、ビタミンB群欠乏症状（舌炎、口内炎、食欲不振、神経炎等）
その他	CK(CPK)上昇、めまい、頭痛、アルドラーゼ上昇、倦怠感、眠気、心悸亢進、四肢しびれ感、筋肉痛、血清カルニチン低下

注：症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

### 4. 高齢者への投与

高齢者には、次の点に注意し、用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

- 本剤は腎排泄型の薬剤であり、高齢者では一般に生理機能が低下していることが多く、高齢者を対象としたセフカペン ピボキシル塩酸塩錠剤の薬物動態の検討において、副作用は認められなかったが、健康成人に比べ尿中回収率はやや低く、血中半減期も延長する傾向が認められている。
- 高齢者ではビタミンK欠乏による出血傾向があらわれることがある。

### 5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。また、妊娠後期にピボキシル基を有する抗生物質を投与された妊婦と、その出生児において低カルニチン血症の発現が報告されている。]

### 6. 小児等への投与

- 低出生体重児、新生児に対する安全性は確立していない。（使用経験がない。）
- 小児（特に乳幼児）においてピボキシル基を有する抗生物質（小児用製剤）の投与により、低カルニチン血症に伴う低血糖があらわれることがある。血清カルニチンが低下する先天性代謝異常であることが判明した場合には投与しないこと。〔その他の注意〕の項参照)

### 7. 臨床検査結果に及ぼす影響

- テストテープ反応を除くベネディクト試薬、フェーリング試薬による尿糖検査では偽陽性を呈することがあるので注意すること。
- 直接クームス試験陽性を呈することがあるので注意すること。

### 8. 適用上の注意

#### 薬剤交付時

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。）

### 9. その他の注意

- 動物試験（イヌ）でCK(CPK)の上昇を伴う筋細胞障害（骨格筋の病理組織学的検査）が認められている。
- 本剤を含むピボキシル基を有する抗生物質（セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物、セフジトレン ピボキシル、セフテラム ピボキシル、テビペネム ピボキシル）の投与により、ピバリン酸（ピボキシル基を有する抗生物質の代謝物）の代謝・排泄に伴う血清カルニチン低下が報告されている。また、小児（特に乳幼児）においては、ピボキシル基を有する抗生物質（小児用製剤）の投与により、低カルニチン血症に伴う低血糖があらわれることがあるので、ピボキシル基を有する抗生物質の投与に際してはカルニチンの低下に注意すること。

### 【薬物動態】

#### 生物学的同等性試験

セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「日医工」及び標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物として75mg（力価））健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中セフカペン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。<sup>2)</sup>


また、セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」及び標準製剤をそれぞれ1錠（セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物として100mg（力価））投与した場合においても、同様に両剤の生物学的同等性が確認された。<sup>2)</sup>

（注意：本剤の承認用法は食後投与である。）

<セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「日医工」>

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-10</sub> (ng·hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
セフカペン ピボキシル塩酸塩錠 75mg「日医工」	1951.12± 458.70	597.10± 179.13	2.20± 1.41	1.61± 0.30
標準製剤 (錠剤、75mg)	2043.78± 460.37	607.06± 142.80	1.83± 0.96	1.89± 0.52


(1錠投与、Mean±S.D., n=20)



<セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」>

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0→10</sub> (ng·hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	t <sub>1/2</sub> (hr)
セフカペン ピボキシル塩酸塩錠 100mg「日医工」	2588.84 ± 597.84	777.62 ± 201.54	1.97 ± 0.70	1.73 ± 0.91
標準製剤 (錠剤, 100mg)	2709.11 ± 588.01	818.21 ± 218.83	2.13 ± 0.68	1.53 ± 0.28

(1錠投与, Mean ± S.D., n=19)




血漿中濃度並びにAUC, Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

### 【薬効薬理】

抗菌力を示す活性体は、吸収時に腸管壁のエステラーゼにより加水分解を受けて生成するセフカペンであり、細菌の細胞壁合成を阻害することで、殺菌的抗菌作用を発揮する。黄色ブドウ球菌では致死標的といわれているPBP（ペニシリン結合たん白）1,2,3のすべてに高い結合親和性を有するが、大腸菌及びプロテウス・ブルガリスでは隔壁合成に必須な酵素のPBP3に高い結合親和性を示す。<sup>3)</sup>

### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物  
(Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate)  
略号：CFPN-PI  
化学名：2,2-Dimethylpropanoyloxymethyl(6*R*,7*R*)-7-[(2*Z*)-2-(2-aminothiazol-4-yl)pent-2-enoylamino]-3-carbamoyloxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate monohydrochloride monohydrate  
構造式：



分子式：C<sub>23</sub>H<sub>29</sub>N<sub>5</sub>O<sub>8</sub>S<sub>2</sub> · HCl · H<sub>2</sub>O

分子量：622.11

性状：白色～微黄白色の結晶性の粉末又は塊で、僅かに特異な

においがある。

*N,N*-ジメチルホルムアミド又はメタノールに溶けやすく、エタノール(99.5)にやや溶けやすく、水に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

### 【取扱い上の注意】

#### 安定性試験

本品につき加速試験(40℃, 相対湿度75%, 6ヵ月)を行った結果、セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「日医工」及びセフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。<sup>4)</sup>

### 【包装】

セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「日医工」

100錠(10錠×10; PTP)

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」

100錠(10錠×10; PTP)

500錠(10錠×50; PTP)

500錠(バラ)

### 【主要文献】

- 厚生労働省健康局結核感染症課編：抗微生物薬適正使用の手引き
- 日医工ファーマ株式会社 社内資料：生物学的同等性試験
- 第十七改正日本薬局方解説書 C-2697, 廣川書店, 東京(2016)
- 日医工ファーマ株式会社 社内資料：安定性試験

### 【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

☎ (0120) 517-215

Fax (076) 442-8948

販売元  
**日医工株式会社**  
NICH-IKO 富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売元

**日医工ファーマ株式会社**  
富山市総曲輪1丁目6番21