

貯法：室温保存

有効期間：3年

溶解剤

日本薬局方

プロピレングリコール

Propylene Glycol

許可番号 27A2X00107

販売開始 1958年4月

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	プロピレングリコール
成分	1mL中 日局プロピレングリコール1mL

## 3.2 製剤の性状

販売名	プロピレングリコール
性状	無色澄明の粘稠性のある液である。

## 4. 効能又は効果

注射剤、内用剤などの溶解補助剤、軟膏基剤として調剤に用いる。

## 6. 用法及び用量

注射剤、内用剤などの溶解補助剤、軟膏基剤として調剤に用いる。


## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：プロピレングリコール（Propylene Glycol）

分子式： $C_3H_8O_2$

分子量：76.09

化学構造式：



性状：無色澄明の粘稠性のある液で、においはなく、味は僅かに苦い。

水、メタノール、エタノール（95）又はピリジンと混和する。

ジエチルエーテルに溶けやすい。

吸湿性である。

比重 $d_{20}^{20}$ ：1.035～1.040

## 20. 取扱い上の注意

火気を避けて保存すること。

## 22. 包装

500mL [ポリ容器]

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

丸石製薬株式会社 学術情報部

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2

TEL. 0120-014-561

## 26. 製造販売業者等

## 26.1 製造販売元

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2